



Pesquisa e Desenvolvimento
Santa Maria/RS – Brasil
Safra 2019/20

Apresentação resultados parciais:

Velocidade de dessecação

BIOMONTE



Aplicação em dessecação

Controle de: *Eleusine indica*

Data da Aplicação: 07/11/2019

Delineamento experimental de blocos ao acaso, com 4 repetições

Parcelas: 3 m de largura por 5 metros de comprimento = 15 m².

Avaliação visual
realizada aos 5
DAA

<i>Eleusine indica</i>			
Tratamentos	Doses L ou Kg P.C/ha	5 DAA	Média
1) Testemunha	0,00	0,0	0
		0,0	
		0,0	
		0,0	
2) Glifosato	3,00	85,0	82,5
		85,0	
		80,0	
		80,0	
3) Glifosato + Solo Bio	3,00 + 1,00	100,0	98,8
		95,0	
		100,0	
		100,0	



1. Testemunha



2. Glifosato (3,0 L ha⁻¹)



3. Glifosato + Solo Bio (3,0 + 1,0 L ha⁻¹)



Avaliação visual
realizada aos 10
DAA



1. Testemunha



2. Gliphosato (3,0 L ha⁻¹)



3. Glifosato + Solo Bio (3,0 + 1,0 L ha⁻¹)



<i>Eleusine indica</i>			
Tratamentos	Doses L ou Kg P.C/ha	10 DAA	Média
1) Testemunha	0,00	0,0	0,0
		0,0	
		0,0	
		0,0	
2) Glifosato	3,00	75,0	78,8
		80,0	
		80,0	
		80,0	
3) Glifosato + Solo Bio	3,00 + 1,00	100,0	100,0
		100,0	
		100,0	
		100,0	

OBS:

- Após 10 dias da aplicação observou se que o tratamento Glifosato + SoloBio proporcionou 100% de controle nas plantas daninhas *Eleusina indica*. Além disso, não foi observado rebrote de outras plantas daninhas, por exemplo, *Richardia brasiliensis*.



Contato:

danie.sanchotene@biomonte.com.br

(55) 98131.7235

 **BIOMONTE**